

Calendario de vacunación para adultos, personas de la tercera edad e individuos en alto riesgo de B.C.

| Vacuna | Adulto | 65 años o más | Programa de alto riesgo [†] |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| La vacuna contra la varicela (#44b) ¹ | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Vacuna contra la hepatitis A (#33) | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vacuna contra la hepatitis B (#25a) ² | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) (#101b) ³ | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vacuna desactivada contra la influenza (gripe) (#12d) ⁴ | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (SPR) (#14a) ⁵ | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Vacuna meningocócica C conjugada (Men-C) (#23a) ⁶ | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Vacunas meningocócicas cuadrivalentes (#23b) | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vacuna conjugada contra el neumococo (Prevenar 13) (#62a) | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vacuna neumocócica polisacárida (#62b) | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vacuna contra el tétanos y la difteria (Td) (#18a) ⁷ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Vacuna contra el tétanos, difteria y tos ferina (DTPa) (#18c) ⁸ | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Nota: El calendario de vacunación puede cambiar. Hable con su proveedor de asistencia sanitaria, o llame al **8-1-1** si tiene dudas. Esta tabla de inmunización ha sido desarrollada y revisada por HealthLinkBC, el BC Ministry of Health (Ministerio de Salud de B.C.) y el BC Centre for Disease Control (Centro de control de enfermedades de B.C.).

[†] **Programa de alto riesgo:** La Colombia Británica administra muchas vacunas gratuitamente a algunos grupos de personas. Por ejemplo, las personas con enfermedades crónicas o el sistema inmunitario debilitado pueden recibir vacunas de manera gratuita. Póngase en contacto con su proveedor de asistencia sanitaria, o llame al **8-1-1** para obtener más información.

¹ Se recomienda que los adultos que no han sido vacunados reciban dos dosis de la vacuna. Es posible que algunos adultos no necesiten recibir la vacuna. Si ha tenido la varicela o el herpes zóster después de cumplir un año de edad, y si tuvo la enfermedad antes de 2004, o si esto ha sido confirmado por una prueba de laboratorio, no necesita recibir la vacuna.

² La vacuna contra la hepatitis B se administra de manera gratuita a personas nacidas en 1980 o posteriormente que nunca hayan recibido la vacuna o que no hayan recibido el número de dosis recomendadas para su edad.

³ La vacuna VPH (HPV, por sus siglas en inglés) se administra de manera gratuita a adultos que cumplan los requisitos y que tengan 26 años de edad o menos.

⁴ La inmunización anual contra la influenza se administra de manera gratuita a personas con un alto riesgo de enfermarse gravemente debido a la influenza. También es gratuita para personas que puedan transmitir la influenza a aquellos con un alto riesgo de enfermarse gravemente.

⁵ Cualquier persona nacida en 1970 o posteriormente que no haya sido inmunizada o que no tenga inmunidad contra el sarampión, las paperas y la rubéola debería recibir 2 dosis de la vacuna SPR (MMR, por sus siglas en inglés).

⁶ La vacuna Men-C se administra de manera gratuita a personas nacidas antes de 2002 que tienen 24 años de edad o menos y que no han recibido una dosis de la vacuna al cumplir 10 años de edad o posteriormente.

⁷ La vacuna Td se administra a adultos que no han sido vacunados o cuyo historial de inmunizaciones se desconoce. Se recomienda recibir una dosis de refuerzo de la vacuna cada 10 años. Si tiene un corte o una herida grave y corre un alto riesgo de una infección por tétanos, es posible que se le recomiende recibir la vacuna.

⁸ La vacuna DTPa (Tdap, por sus siglas en inglés) se administra de manera gratuita a adultos que no han sido vacunados siendo más pequeños o cuyo historial de inmunización se desconoce. La vacuna se recomienda, pero no se proporciona de manera gratuita, a: adultos de 18 años de edad o más que han sido vacunados contra la tos ferina siendo más pequeños pero que no han recibido una vacuna que contenga la tos ferina siendo adultos; y mujeres embarazadas (para cada embarazo) independientemente de su historial de inmunización.